

ASPIRACIÓN DE QUISTE / ATEC BIOPSIA BIOPSIA ESTEREOTÁCTICA

1. Si es necesario aplique hielo dentro de su braciol sobre la incision por 4 a 6 horas por 30 minutos si y 30 minutos no.
2. Si usted se siente que necesita tomar algo para el dolor, solo tome Tylenol y no productos que contengan aspirina.
3. Favor de no remover el bendaje por 24 horas. Espere un poco de desague en su bendaje.
4. Favor de esperar 24 horas despues de el procedimiento para ducharse. Despues de las 24 horas – se puede duchar con las tiras o benditas que fueron localizada en su piel en la area de incisión. Si se salen las tiras o benditas del steri – no es necesario que las reemplase.
5. Probablemente sentiras molestia y es posible que la area en donde entro la aguja este un poco morada.
6. En caso que usted sangre o sienta extensos dolor, precione el area por 30 minutos. Si el sangrado no para LLAME A LA OFICINA INMEDIATAMENTE
7. Limitise a cualquier actividad fisica el dia de el procedimiento. Por favor no le vante objetos pesados, no cocine, limpie, ejercise y no deportes por las primera 24 horas.
8. Despues de las 24 horas, usted puede recgrsar ha su trabajo con actividades normal.
9. Usar su braciol 24 horas al dia, hasta el dia ques regrese a su sita.
10. Regrese a la cita de seguimiento con la Doctora Sachedina

SI TIENES ALGUN PROBLEMA, LLAMENOS AL (407) 740-5127.